

Couronne et Facette

Préparation Des Dents

- ⌚ Pour ajuster la forme et la taille des dents, une procédure est appliquée à une partie de l'émail dentaire.
- ⌚ Après le processus de préparation, si vous ressentez de la douleur suite à l'anesthésie, vous pouvez utiliser des antidouleurs.
- ⌚ Il est naturel de ressentir de la sensibilité après le processus de préparation. Évitez les aliments chauds, froids et durs jusqu'à ce que le processus soit terminé.
- ⌚ Dans certains cas, le dentiste peut appliquer une couronne temporaire après la préparation. Il est normal de ressentir une pression sur vos gencives pendant ce processus.

Premières 24 Heures



Ne mangez ni ne buvez jusqu'à ce que l'engourdissement disparaisse. Faites attention de ne pas vous mordre les joues ou la langue. Évitez de mordre des objets durs.



Vos dents peuvent être sensibles aux aliments chauds ou froids, évitez-les. Cela passera dans les deux premières semaines.



Évitez les exercices intenses et les activités fatigantes. Se reposer accélérera votre processus de récupération.

Soins et Conseils Généraux

- ⌚ Si votre couronne ou votre facette se détache ou tombe, consultez votre conseiller dès que possible.
- ⌚ Utilisez du fil dentaire tous les jours et brossez-vous les dents deux fois par jour.
- ⌚ Si vous ressentez une sensibilité excessive ou de la douleur, consultez votre dentiste.
- ⌚ Pour assurer une longue durée de vie à vos couronnes et facettes, n'oubliez pas d'utiliser un protège-dents nocturne.



Utilisation Des Médicaments

Prenez tous
vos médicaments
jusqu'à
épuisement



Antibiotiques

Les antibiotiques doivent être pris deux fois par jour, toutes les 12 heures après les repas, selon votre condition médicale.

Antidouleurs

Les antidouleurs doivent être pris sous forme d'un comprimé toutes les 12 heures après les repas et peuvent être prescrits par un médecin selon la situation.

Bain de Bouche

Après une opération d'implant, un bain de bouche ou un rince-bouche doit être utilisé 24 heures plus tard pour éviter la dissolution des caillots sanguins aux sites d'implantation et la poursuite des saignements.



Veillez contacter votre conseiller médical dans les situations suivantes:

- ⚠ Si vous ressentez des effets secondaires tels que la diarrhée, le muguet buccal ou des douleurs à l'estomac!
- ⚠ Si vous êtes allergique à des préparations médicales telles que la pénicilline, l'ibuprofène ou le paracétamol!

Temps de Sourire

esvita
CLINIC

GUIDE
D'INFORMATIONS
POST-OPÉRATOIRE

Traitement Par Implant

Choses auxquelles vous devez prêter attention pour les soins post-procédure



Aliments et Boissons

Ne mangez ni ne buvez pendant 2 heures. Ensuite, vous pouvez consommer des aliments froids et mous. Évitez les aliments chauds, durs et difficiles à mâcher. Ne pas utiliser de paille. Fumer et boire de l'alcool peuvent retarder le processus de guérison.



Soins Bucco-Dentaires

Ne rincez pas ni ne gargarisez votre bouche pendant les premières 24 heures, et ne crachez pas. Dès le lendemain, rincez doucement la zone de l'implant avec de l'eau tiède après chaque repas. Brossez les autres dents, à l'exclusion de la zone de l'implant, avec une brosse à poils souples. Ne touchez pas la zone de l'implant avec votre main ou votre langue.



Sommeil et Activité

Dormez avec la tête surélevée pendant les trois premiers jours. Évitez les exercices lourds et les activités fatigantes.




Saignement

Mordez sur une compresse de gaze pendant les 30 premières minutes. Si le saignement continue, remplacez-la par une compresse propre.

Ne Paniquez Pas!

Le gonflement, les ecchymoses et la douleur dans la zone de l'implant sont normaux. Ils disparaissent généralement en quelques jours.



Informations Supplémentaires

- Vous pouvez appliquer une compresse froide pour réduire le gonflement le premier jour.
- Si vous prenez des antibiotiques, utilisez-les pendant la durée recommandée.
- Utilisez le bain de bouche spécial recommandé par votre dentiste.
- Si vous avez une prothèse dentaire, utilisez-la selon les directives de votre médecin.

Élévation Des Sinus et Greffe Osseuse



Premières 48 Heures

- Ne pas cracher, éviter les aliments durs et chauds.
- Ne pas fumer ou utiliser de cigarettes électroniques, et éviter l'alcool.
- Ne pas utiliser de bain de bouche, nettoyez votre nez doucement.
- Évitez de vous allonger face contre terre.
- Si vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, gardez la bouche ouverte.



Première Semaine

- Utilisez les médicaments prescrits, brossez-vous les dents doucement.
- Évitez les aliments chauds et froids.
- Rincez-vous la bouche avec de l'eau salée ou un bain de bouche antiseptique.
- Évitez les exercices physiques intenses.
- Évitez les activités qui augmentent votre tension artérielle.

Traitement de Canal Radiculaire



Après le Traitement

Il est normal de ressentir de la douleur et de l'inconfort pendant quelques jours.

Nourriture/Boisson

Évitez les aliments froids/chauds et collants comme le chewing-gum pendant au moins 2 heures après un traitement de canal.

Hygiène Bucco-Dentaire

L'hygiène dentaire est importante; choisissez des produits comme le fil dentaire et le bain de bouche qui ne vont pas endommager les dents.

Gestion De La Douleur

Pour réduire la douleur et le gonflement, vous pouvez vous gargariser avec de l'eau salée trois fois par jour. Si vous ressentez de la douleur, utilisez les analgésiques recommandés par votre médecin.



Prothèse Dentaire

Vous ressentirez une sensation de plénitude dans vos lèvres et vos joues. Cette sensation est temporaire.

L'adaptation à une prothèse dentaire inférieure peut prendre un peu plus de temps que l'adaptation à une prothèse dentaire supérieure.

Au début, la stimulation des glandes salivaires peut augmenter la quantité de salive.

Utilisation De Prothèses

Après vous être habitué à votre prothèse dentaire, elle doit être retirée au coucher pour reposer les tissus buccaux. Lorsque les prothèses sont retirées la nuit, elles doivent être gardées humides dans un contenant.

Soins Des Prothèses

Pour une bouche saine, il est nécessaire de nettoyer les résidus alimentaires de votre prothèse dentaire après chaque repas. Utilisez une brosse douce et du savon liquide ou du savon pour le nettoyage. En plus du nettoyage quotidien, des comprimés de nettoyage peuvent être utilisés une fois par semaine.

Parole/Apparence

Lorsque vous commencez à utiliser la prothèse, des mouvements brusques comme rire et tousser peuvent déplacer la prothèse dans votre bouche. Une fois que tous vos muscles se sont adaptés à la prothèse, votre apparence reviendra à la normale. L'affaissement de vos joues et de vos lèvres sera corrigé avec votre prothèse, vous faisant paraître plus jeune.