

Corone e Faccette

Processo di Preparazione

- Per regolare la forma e le dimensioni dei denti, viene applicata una procedura che coinvolge una parte dello smalto del dente.
- Dopo che il processo di preparazione è completato, se provi dolore dopo l'anestesia, puoi utilizzare antidolorifici.
- È normale provare sensibilità dopo il processo di preparazione. Evita cibi caldi, freddi e troppo duri fino a quando il processo non è completato.
- In alcuni casi, il medico potrebbe applicare una corona temporanea dopo la preparazione. È normale provare pressione sulle gengive durante questo processo.

Prime 24 Ore

- Non mangiare o bere finché non passa l'insensibilità. Sta attento a non morderti le guance/lingua. Evita di mordere oggetti duri.
- I tuoi denti potrebbero essere sensibili ai cibi caldi o freddi, quindi evita di mangiarli. Questo sintomo passerà entro le prime due settimane.
- Evita l'esercizio fisico intenso e le attività faticose. Riposare accelererà il tuo processo di guarigione.

Cura e Consigli Generali

- Se la tua corona o faccetta si allenta o cade, contatta il tuo consulente il prima possibile.
- Usa il filo interdentale ogni giorno e spazzola i denti due volte al giorno.
- Se avverti sensibilità eccessiva o dolore, consulta il tuo dentista.
- Per garantire una vita più lunga alle tue corone e faccette, non trascurare di utilizzare un paradenti durante la notte. (Bite notturno)



Uso dei Farmaci

Si consiglia di consumare tutti i tuoi farmaci fino a quando non sono terminati.



Antibiotico

Gli antibiotici dovrebbero essere assunti due volte al giorno, ogni 12 ore dopo i pasti. Questo può variare a seconda della tua condizione medica.

Antidolorifici

Gli analgesici dovrebbero essere assunti una compressa ogni 12 ore dopo i pasti e possono essere prescritti da un medico a seconda della situazione.

Collutorio

Dopo un intervento di implantologia, il collutorio o il risciacquo orale dovrebbero essere utilizzati 24 ore dopo per prevenire la dissoluzione dei coaguli di sangue nei siti degli impianti e il protrarsi del sanguinamento.



Si prega di contattare il proprio consulente medico nelle seguenti situazioni:

- Se si verificano effetti collaterali come diarrea, candidosi orale (mughetto) o dolore allo stomaco!
- Se si è allergici a qualsiasi preparato medico come la penicillina, l'ibuprofene o il paracetamolo!



È tempo Di Sorridere


esvita
CLINIC

GUIDA
INFORMATIVA
POST-OPERATORIO

Trattamento Degli Impianti

Cose a cui dovresti prestare attenzione nella cura post-procedura



Cibo e Bevande

Non mangiare né bere per 2 ore. Successivamente, puoi consumare cibi freddi e morbidi. Evita cibi caldi, duri e difficili da masticare. Non usare la cannuccia. Fumare e bere alcolici possono ritardare il processo di guarigione.



Cura Orale

Non fare gargarismi o sciacquare la bocca per le prime 24 ore, e non sputare. Dal giorno successivo, sciacquare delicatamente l'area dell'impianto con acqua tiepida dopo ogni pasto. Spazzola gli altri denti, escludendo l'area dell'impianto, con un spazzolino a setole morbide. Non toccare l'area dell'impianto con la mano o con la lingua.



Sonno e Attività

Dormi con la testa sollevata per i primi 3 giorni. Evita esercizi fisici intensi e attività faticose.



Sanguinamento

Mordi su un tampone di garza per i primi 30 minuti. Se il sanguinamento continua, sostituiscilo con un tampone di garza pulito.



Niente Panico!

Gonfiore, lividi e dolore nell'area dell'impianto sono normali. Di solito scompaiono entro pochi giorni.

Ulteriori Informazioni

- 🕒 Puoi applicare una compressa fredda per ridurre il gonfiore il primo giorno.
- 🕒 Se stai assumendo antibiotici, utilizzali per la durata consigliata.
- 🕒 Utilizza il collutorio speciale raccomandato dal tuo dentista.
- 🕒 Se hai una protesi dentaria, utilizzala come indicato dal tuo medico.

Rialzo Seno Mascellare



Prime 48 Ore

- 🕒 Non sputare, evitare cibi duri e caldi.
- 🕒 Non fumare né utilizzare sigarette elettroniche, e astenersi dall'alcol.
- 🕒 Non utilizzare il collutorio, pulire il naso delicatamente.
- 🕒 Evitare di stare sdraiati a faccia in giù.
- 🕒 Se devi starnutire/tosse, tieni la bocca aperta.



Prima Settimana

- 🕒 Utilizzare i farmaci prescritti, spazzolare i denti delicatamente.
- 🕒 Evitare cibi caldi e freddi.
- 🕒 Sciacquare con acqua salata o collutorio antisettico.
- 🕒 Evitare esercizi fisici intensi.
- 🕒 Evitare attività che aumentano la pressione sanguigna.

Devitalizzazione



Dopo il trattamento è normale provare dolore e disagio per alcuni giorni

Cibo/Bevande

Evitare cibi/bevande freddi/caldi e appiccicosi come gomme per almeno 2 ore dopo un trattamento canalare.

Salute Orale

L'igiene dentale è importante; scegli prodotti come il filo interdentale e il collutorio che non danneggino i denti.

Gestione del Dolore

Per ridurre il dolore e il gonfiore, puoi fare gargarismi con acqua salata tre volte al giorno. Se provi dolore, utilizza gli antidolorifici raccomandati dal tuo medico.



Protesi Dentaria

Nei primi giorni, la stimolazione delle ghiandole salivari potrebbe aumentare la quantità di saliva.

Adattarsi a una protesi inferiore potrebbe richiedere un po' più di tempo rispetto all'adattamento a una protesi superiore.

Sentirai una sensazione di pienezza nelle labbra e nelle guance. Questa sensazione è temporanea.

Utilizzo

Una volta che ti sei abituato alla tua protesi, dovrebbe essere rimossa prima di andare a dormire per permettere ai tessuti orali di riposare. Quando le protesi vengono rimosse di notte, dovrebbero essere mantenute umide in un contenitore.

Cura

Per mantenere una bocca sana, è necessario pulire i residui di cibo dalla tua protesi dopo ogni pasto. Utilizza una spazzola morbida e sapone liquido o apposito per la pulizia. Oltre alla pulizia quotidiana, è possibile utilizzare compresse detergenti una volta alla settimana.

Oratoria/Aspetto

Quando inizi ad utilizzare la protesi, movimenti improvvisi come ridere e tossire possono spostarla nella tua bocca. Una volta che tutti i tuoi muscoli si saranno adattati alla protesi, il tuo aspetto tornerà alla normalità. L'abbassamento delle guance e delle labbra sarà corretto dalla protesi, facendoti apparire più giovane.